





1a Fulles mitjanes i superiors perfoliades (travessades per la tija) [a]; involucre nul [b]; herba anual, ± glaucescent [c]..... 2



1b Fulles no perfoliades (de vegades són amplexicaules) [a]; involucre d' 1-6 bràctees [b]; planta anual o perenne..... 3



2a Umbel.les amb (2)5-10 radis [a]; fruit llis [b]..... [*B. rotundifolium*](#)



2b Umbel.les amb 2-3(5) radis [a]; fruit tuberculat o rugós [b]..... [*B. lancifolium*](#)




3a Fulles amb nervació pinnato-reticulada (un sol nervi principal i nervis secundaris divergents, anastomitzats entre ells)..... 4



3b Fulles $\pm$ paral·lelinèrvies..... 5




4a Planta herbàcia [a]; fulles blanques [b]; bractèoles que ultrapassen la umbel·lula [c]; umbel·la amb 3-6 radis [d].....[B. angulosum](#)




4b Arbust o mata llenyosa [a]; fulles coriàcies; bractèoles molt més curtes que la umbel·lula [b]; umbel·la amb (2)5-30 radis [c].....[B. fruticosum](#)



5a Planta perenne , llenyosa o herbàcia, de rabassa gruixuda i sovint amb rebrots estèrils [a]; fulles variables [b]; bràctees de l'involucre més curtes que els radis de la umbel·la [c]..... [6](#)




5b Planta anual, de rel prima, sense rebrots estèrils [a]; fulles estretament linear-lanceolades [b]; bràctees més curtes que els radis de la umbel·la, o més llargues [c]..... [9](#)



6a Planta herbàcia [a]; fulles inferiors de més de 0,5 cm d'amplada, atenuades en pecíol, normalment amb més de 5 nervis, les superiors reduïdes [b]..... 7





6b Planta llenyosa o herbàcia [a]; fulles de 0,2-0,5 cm d'amplada (molt rarament les superiors de 0,5-0,7 cm), normalment amb 3-5 nervis [b].... 8



7a Fulles coriàcies, grisenques o glaucescents, amb nervis molt prominents, disposades $\pm$ en roseta a la base de la tija [a]; umbel·les de 2-4(5) radis, en ampla panícula [b]..... [*B. rigidum*](#)



7b Fulles poc coriàcies, verdes, amb nervis poc prominents, distribuïdes de manera $\pm$ regular al llarg de la tija [a]; umbel·les de 3-15 radis, en panícula laxa [b]..... [*B. falcatum*](#)



8a Planta herbàcia, cespitosa, petita [a]; fulles basals en roseta, sublinears, les caulinar poc nombroses, $\pm$ amplexicaules, totes poc coriàcies [b]; tiges floríferes simples o poc ramificades [c] [B. ranunculoides](#)

a-b-c



8b Planta generalment amb tija aèria $\pm$ lignificada [a]; fulles coriàcies, sublinears, totes semblants entre elles, rarament disposades en roseta basal [b]; tiges floríferes normalment ramificades [c]..... [B. fruticescens](#)


a-b-c




b




9a Bràctees de l'involucre ovato-lanceolades, que ultrapassen molt els radis de la umbel·la [a]; bractèoles de l'involucel ovato-lanceolades, que cobreixen completament les flors i els fruits [b]..... [B. baldense](#)




9b Bràctees de l'involucre linears o linear-lanceolades, més curtes que els radis més llargs de la umbel·la [a]; bractèoles linears o linear-lanceolades, que no cobreixen les flors ni els fruits [b]... [10](#)





10a Fruit subglobós, cobert de papil·les o petits tubercles [a]; fulles de 0,5-5(7) cm, $\pm$ glauques [b]; tija feble, sovint $\pm$ decumbent [c] [11](#)



10b Fruit ovoide-oblong, llis [a]; fulles de 4-15(20) cm [b]; tija rígida, erecta [c].....[12](#)





11a Fruit de 0,5-1,5 mm, amb papil·les blanques i pràcticament sense costes [a]; 3-6 radis umbel·lars [b]; (3)5 bractèoles de 3-5 mm [c]; planta de 2-30 cm [d]... [*B. semicompositum*](#)



11b Fruit d'1,5-2,5 mm, amb papil·les brunenques i amb costes netament visibles; 1-3(4) radis umbel·lars; 1-5 bractèoles d'1-3 mm; planta de 10-60 cm.....[*B. tenuissimum*](#)



12a Fruit de (3)4-6(7) mm [a]; bractèoles més curtes que les flors i que els fruits [b]; umbel·les terminals de 3(4-5) radis, les laterals de 2-3 radis [c]; fulles amb 5-7(19) nervis [d]..... [B. praealtum](#)



12b Fruit de 2-3(3,5) mm; les bractèoles ultrapassen les flors i els fruits; umbel·les terminals de 4-7 radis, les laterals de 3-6 radis; fulles amb 3-5(7) nervis..... [B. gerardi](#)

