







1a Fulles compostes de folíols lanceolats de 5-15(18) cm [a]; síliques de 4-8 cm [b]; pètals d'1,4-2,2 cm [c]; planta amb rizoma horitzontal esquamós i amb fulles poc nombroses [d] [subgèn. *Dentaria*] **2**




1b Fulles enteres o compostes de folíols més petits (rarament el terminal més gran i, en aquest cas, suborbicular) [a]; síliques de 0,8-4 cm [b]; pètals en general més petits [c] [subgèn. *Cardamine*]..... **3**



2a Fulles pinnaticompostes, amb 5-9 folíols [a]; rizoma de 4-10 mm de diàm., cobert d'esquames obtuses d'1-2 mm [b].. [C. heptaphylla](#)



2b Fulles palmaticompostes, amb 3-5 folíols [a]; rizoma d'1,5-2,5 mm de diàm., cobert d'esquames triangulars, agudes, trífides, de 6-10 mm [b] [C. pentaphyllos](#)



3a Fulles caulinars amb petites aurícules amplexicaules a la base del pecíol **4**




3b Pecíol sense aurícules basals..... **5**



4a Fulles enteres o lirato-pinnatipartides (rarament pinnatisectes), amb 3-7 segments enters (rarament $\pm$ dentats) [a]; pètals de 3-6 mm [b]

..... [*C. resedifolia*](#)



4b Fulles totes pinnaticompostes, les caulinars amb 13-19 folíols dentats o lobulats [a]; pètals de 2-3 mm (rarament nuls) [b]..... [*C. impatiens*](#)




5a Fulles simples i enteres (rarament sinuades o lobades).....

.....[C. bellidifolia](#)


5b Fulles pinnaticompostes o pinnatisectes..... [6](#)



6a Pètals de 2-3 mm, poc més llargs que el calze, de vegades nuls [7](#)




6b Pètals de més de 5 mm, 2-3 vegades més llargs que el calze... [9](#)





7a Planta enterament glabra [a]; fulles amb 11-19 folíols oblongo-linears [b]; pètals d'1,8-2,5 mm [c]..... [C. parviflora](#)




7b Planta ± pilosa, sobretot a la base [a]; fulles amb 5-13 folíols ovats o reniformes (almenys els terminals de les fulles inferiors) [b]; pètals de 2,5-3 mm [c]..... [8](#)




8a Anual; tija dreta o molt poc flexuosa [a]; (1)2-4(6) fulles caulinars més petites que les de la roseta basal, que sol ésser ben desenvolupada [b]; 4(6) estams [c]. [C. hirsuta](#)



8b Biennal en general; tija flexuosa [a]; (4)6-12 fulles caulinars, les superiors en general més grans que les inferiors [b]; roseta basal sovint desapareguda al temps de la florida [c] ; 6 estams [d]..... [C. flexuosa](#)




9a Folíol terminal de les fulles caulinars mitjanes orbicular, reniforme o amplament el·líptic, de més de 2 cm d'amplada..... [10](#)




9b Folíol terminal de les fulles caulinars mitjanes estretament el·líptic, lanceolat o oblongo-linear, de menys d' 1,5(2) cm d'amplada [11](#)




10a Pètals rosa (molt rarament blancs) de 9-13 mm [a]; síliqua d'1,5-1,8 mm d'amplada [b]; fulles caulinars superiors amb el folíol terminal suborbicular [c]..... [*C. raphanifolia*](#)



10b Pètals blancs, de 7-9 mm [a]; síliqua de 0,8-1 mm d'amplada [b]; fulles caulinars superiors amb el folíol terminal oblongo-lanceolat [c]; planta de gust picant, amb estolons epigeus llargs, foliosos [d]..... [*C. amara*](#)



11a Pètals blancs [a]; estigma tan ample com l'estil o més estret [b]; més de 5 fulles caulinars, amb folíols obovats o oblongo-lanceolats [c]..... [C. amara](#)



11b Pètals rosa (molt rarament blancs) [a]; estigma més ample que l'estil [b]; menys de 5 fulles caulinars, amb folíols oblongs o oblongo-linears [c].... [C. pratensis](#)

