


**1a** Fulles totes linears, espatulo-linears o estretament oblongues, les de la roseta basal normalment 1-3-nervades ..... [\*C. quadrifolium\*](#)



**1b** Fulles totes ovato-el·líptiques, lanceolades o oblongues, les de la roseta basal normalment 3-7-nervades ..... [2](#)




**2a** Flors subsèssils, en cimes espiciformes unilaterals i laxes; estil no bífid [C. spicatum](#)


**2b** Flors pedicel·lades o subsèssils, disposades en cimes corimbiformes o bípares (rarament flors solitàries) [a]; estil bífid [b]..... **3**





**3a** Corol·la groga (o, més rarament, rosada amb el centre groc) [a]; estil fes fins a la meitat [b]; flors pedicel·lades en cima bípara pauciflora [c]..... [C. maritimum](#)



**3b** Corol·la rosada o purpúria (rarament blanca) [a]; estil fes fins a 1/3 [b]; flors pedicel·lades o subsèssils, generalment en cima corimbiforme (més rarament en cima bípara o, fins i tot, solitàries) [c]..... [4](#)



**4a** Flors (almenys les inferiors, centrals, de les cimes) netament pedicel·lades [a]; calze de les flors obertes, en general, poc més curt que el tub de la corol·la [b]; planta anual, sense roseta basal de fulles o amb roseta ± caduca [c]; fulles caulinaris inferiors sovint més petites que les superiors [d]..... [C. pulchellum](#)



**4b** Flors subsèssils [pedicels de 0-1(2) mm] [a]; longitud del calze de les flors obertes fins a 3/4 de la del tub de la corol·la [b]; planta biennal o anual, generalment amb una roseta basal de fulles [c]; fulles caulinaris inferiors normalment més grans que les superiors [d]..... [C. erythraea](#)

