






**1a** Fulles palmatipartides o palmatisectes [a]; bràctees obovato-cuneades, d'1-3 cm d'amplada (sense comptar les espines) [b]; dents del calze patents, de 4-5 mm [c]; bractèoles (situades entremig de les flors) tripartides [d]..... [\*E. maritimum\*](#)



**1b** Fulles 1-2-pinnatipartides [a]; bràctees linear-lanceolades, de 0,2-0,5 cm d'amplada [b]; dents del calze erectes, de 2-3 mm [c]; bractèoles enteres (rarament trífides a *E. bourgatii*) [d]..... [2](#)



**2a** Planta d'un verd grisenc clar, sense gens de blau [a]; 3-7 bràctees  $\pm$  patents [b]; (10)25-100 glomèruls per inflorescència [c]; flors blanques [d]; esquames del fruit agudes [e]; segments foliars de (3)5-15 mm d'amplada [f]..... [\*E. campestre\*](#)



**2b** Planta  $\pm$  blava a la summitat [a]; 10-15 bràctees ascendents [b]; 3-7 glomèruls per inflorescència [c]; flors blaves [d]; esquames del fruit obtuses [e]; segments foliars de 2-4(5) mm d'amplada [f]..... [\*E. bourgatii\*](#)

