

**1a** Capítol gros, de 6-12 cm de diàm. (compreses les bràctees radiants amb aspecte de lígula), en general únic [a]; planta rosulada acaule o amb tija curta (excepcionalment pot atènyer 1-3 dm) [b].....[2](#)



**1b** Capítols més petits, de diàmetre no superior a 4 cm [a]; planta amb tija ben desenvolupada, sovint ramificada i amb diversos capitols [b].....[3](#)



**2a** Bràctees interiors de l'involucre, liguliformes, grogues [a]; planta acaule [b]; papus de 18-25 mm [c]..... [C. acanthifolia](#)



**2b** Bràctees interiors, liguliformes, d'un blanc argentí o ± rosaci [a]; planta general ± caulescent [b]; papus de 12-14 mm [c]..... [C. acaulis](#)



**3a** Bràctees interiors de l'involucre, liguliformes, purpúries a totes dues superfícies [a]; planta anual [b]..... [C. lanata](#)

**3b** Bràctees interiors grogues o blanquinooses [a]; planta perenne o biennal..... [4](#)



**4a** Bràctees involucrals interiors, liguliformes, blanquinooses, molt estretes ( $12-20 \times 1-1,5$  mm) [a]; fulles  $\pm$  tomentoses al revers [b]; planta biennal, simple o ramificada a la summitat [c]..... [C. vulgaris](#)



**4b** Bràctees liguliformes d'un groc viu, més amples ( $10-16 \times 1,5-2,5$  mm) [a]; fulles glabres o glabrescents [b]; planta perenne, sovint multicaule i ramificada [c] [C. corymbosa](#)

