



Flora Catalana

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora

<http://www.floracatalana.cat>

Clau dicotòmica
del gènere

Dactylis

Montse Boqueras Bailina



Dactylis glomerata comprèn tres subespècies

a1. Panícula oblonga, estreta, amb l'entrenús inferior molt més llarg que les ramificacions basals [a]; fulles normalment d'1-3(6) mm d'amplada [b] . . . *D. glomerata* subsp. *hispanica*



a2. Panícula ± ampla, amb l'entrenús inferior ordinàriament més curt que les ramificacions basals [a]; fulles normalment de 3-10 mm d'amplada [b]

. . . . **b**




NOTA



b1. Espiguetes \pm obtriangulars, amb 3-4(6) flors [a]; flors inferiors més grosses [b]; glumes coriàcies, verdes, ciliades [c]

.... *D. glomerata* subsp. *glomerata*



b2. Espiguetes lanceolades, amb 5-6(8) flors, totes de la mateixa mida [a]; glumes no coriàcies, pàl·lides [b]

.... *D. glomerata* subsp. *lobata*

D. glomerata subsp. *aschersoniana*



En el treball *An annotated Checklist of the Vascular Plants of Catalonia* (Sáez & Aymerich, 2021) només es recull un tàxon *D. glomerata* en sentit ampli i comenta que les tres subespècies citades a Catalunya són gairebé indistingibles morfològicament. També recullen les dades de distribució: mentre que *D. glomerata* subsp. *glomerata* i *D. glomerata* subsp. *hispanica* estan àmpliament distribuïdes al nostre territori, *D. glomerata* subsp. *lobata* (= *D. glomerata* subsp. *aschersoniana*) només ha estat citada al Ripollès.

Segons WFO (desembre 2025) es consideren vàlides les tres subespècies citades.